

Tabulka 2: Soubor jaterních testů

Test	změna	pravděpodobná diagnóza	poznámka
ALT, AST	zvýšení cca 20x	aktivní vir. hepatitis, polékové a toxické poškození, cirkulační šok	pokles hodnot může znamenat ústup onemocnění, ale i masivní nekrózu, výše hodnot odpovídá rozsahu poškození, ale nikoli prognóze
	zvýšení cca 10x	těžká biliární kolika	většinou do 72 hodin návrat do normy
	zvýšení cca 3x	jat. steatosa, nealkoholická jaterní steatofibróza, chronická hepatitis	
	mírné zvýšení	kompenzovaná jaterní cirhóza, cholestatické nemoci jater, neoplázie	
ALP	zvýšení 5x a více	onemocnění žlučových cest	
	zvýšení méně než 5x	jaterní onemocnění	
GGT	zvýšení	vliv exogenních látek: alkohol, fenobarbital, estrogeny, fenytoin, cimetidin, karbamazepin, heparin, furosemid	
	několikanásobné zvýšení	obstrukce žlučových cest, biliární kolika	
Albumin	snížení	jaterní cirhóza, ascites	
Bilirubin	zvýšení	cholestáza, primární biliární cirhóza, akutní jaterní selhání, jaterní cirhóza	